

Số:
V/v thông tin thuốc tháng 05

Ngọc Hồi, ngày tháng năm

Kính gửi: Các khoa, phòng trực thuộc.

Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế về việc Quy định tổ chức và hoạt động của khoa dược Bệnh viện;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội ban hành Luật tiếp cận thông tin.

Cập nhật thông tin thuốc đến Bác sỹ đang phục vụ khám, chữa bệnh và một số nhân viên y tế có liên quan đến sử dụng thuốc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi như sau:

Thông tin thuốc mới: **Prodiar** (Clopidogrel 75mg+ Aspirin 75mg)

Dưỡng tâm an thần Vinaplant

Giao phòng Hành chính quản trị đăng tải nội dung theo tờ Hướng dẫn sử dụng 02 thuốc (*có nội dung kèm theo*) tại chuyên mục Thông tin thuốc trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện để phục vụ nhân viên y tế tại khoa, phòng tự cập nhật kiến thức liên quan đến sử dụng thuốc nhằm thực hiện công tác sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi ./.

Nơi nhận:

- BGĐ (b/c);
- Các khoa, phòng trực thuộc (t/h);
- Lưu: VT; KD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Thâm

Stt	Biệt dược	Hoạt chất-Nhóm dược lý	Chỉ định	Chống chỉ định	Liều dùng
1	Prodiar (Clopidogrel 75mg+ Aspirin 75mg)	Prodiar là nhóm thuốc chống huyết khối	Được chỉ định để dự phòng thứ phát các tai biến xơ vữa huyết khối ở bệnh nhân người lớn đang dùng cả Clopidogrel và Acid acetylsalicylic trong điều trị: + Hội chứng mạch vành cấp không có ST chênh lên (đau thắt ngực không ổn định hoặc nhồi máu cơ tim không có sóng Q) bao gồm các bệnh nhân được đặt stent sau khi can thiệp mạch vành. +Nhồi máu cơ tim cấp có đoạn ST chênh lên để điều trị tan huyết khối.	Mẫn cảm với các hoạt chất hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. Suy gan nặng. Bệnh lý xuất huyết hoạt động như loét dạ dày, xuất huyết trong não. Mẫn cảm với các thuốc kháng viêm không Steroid và hội chứng hen. Viêm mũi và polyp mũi. Suy thận nặng, ba tháng cuối của thai kỳ.	Người lớn: Uống một viên duy nhất mỗi ngày. Nếu quên uống một liều: Trong vòng ít hơn 12 giờ sau uống thuốc thường lệ: bệnh nhân nên uống ngay 1 viên kế tiếp vào giờ thường lệ. Nếu quên uống hơn 12 giờ: BN chỉ uống liều kế tiếp như thường lệ, không tăng gấp đôi liều thuốc để bù vào liều quên uống.
2	Dưỡng tâm an thần Vinaplant (viễn chí, toan táo nhân, đan sâm, huyền sâm...)	Thuốc thuộc nhóm an thần	Tư âm dưỡng huyết, bổ tâm an thần. Chủ trị: các chứng mất ngủ do lo lắng, tâm thần bất an, tim đập hồi hộp, thần kinh suy nhược, hoa mắt chóng	Phụ nữ có thai, trẻ em dưới 5 tuổi, người tiểu đường.	Uống 2 lần sau bữa ăn. Trẻ từ 5-6 tuổi, mỗi lần 1 gói 3g. Trẻ từ 6-14 tuổi, mỗi lần 2 gói 3g hoặc 1 gói 6g. Trẻ 14 tuổi trở lên và

			mặt, ngủ hay mê, tâm trí hay quên, táo bón.		người lớn, mỗi lần 2-3 gói 3g hoặc 1 gói 6g.
--	--	--	---	--	--

*Trích từ hướng dẫn sử dụng thuốc của các thuốc : **Prodiar 75/75, Dưỡng tâm an thần Vinaplant.***