

Số:

Ngọc Hồi, ngày tháng năm

V/v thông tin thuốc tháng 12

Kính gửi: Các khoa, phòng trực thuộc.

Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế về việc Quy định tổ chức và hoạt động của khoa dược Bệnh viện;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội ban hành Luật tiếp cận thông tin.

Cập nhật thông tin thuốc đến Bác sỹ đang phục vụ khám, chữa bệnh và một số nhân viên y tế có liên quan đến sử dụng thuốc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi như sau:

Thông tin thuốc mới: **Vinbrex 80** (Tobramycin 80mg)

Metronidazol (Metronidazol 500mg)

Tam thất viplant (Bột tam thất)

Giao phòng Hành chính quản trị đăng tải nội dung theo tờ Hướng dẫn sử dụng 03 thuốc (*có nội dung kèm theo*) tại chuyên mục Thông tin thuốc trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện để phục vụ nhân viên y tế tại khoa, phòng tự cập nhật kiến thức liên quan đến sử dụng thuốc nhằm thực hiện công tác sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi ./.

Nơi nhận:

- BGĐ (b/c);
- Các khoa, phòng trực thuộc (t/h);
- Lưu: VT; KD.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Văn Đào

STT	Tên thuốc	Hoạt chất-Nhóm dược lý	Chỉ định	Chống chỉ định	Liều dùng
1	Vinbrex (Tobramycin80 mg)	Vinbrex là kháng sinh nhóm Aminoglycosid	Tobramycin được chỉ định điều trị các nhiễm khuẩn: Nhiễm khuẩn thần kinh trung ương: Viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn huyết ở trẻ sơ sinh -Nhiễm khuẩn đường ruột: Viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn đường tiết niệu phức tạp và tái phát bao gồm viêm bể thận và viêm bàng quang. -Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới: Viêm phổi, viêm phế quản phổi, viêm phế quản cấp tính. -Nhiễm khuẩn da, xương và mô mềm bao gồm cả bỏng. -Tobramycin có thể được xem xét sử dụng trong những trường hợp nhiễm khuẩn tụ cầu nặng khi penicilin và các thuốc ít có khả năng gây độc	Quá mẫn với Tobramycin hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc . Người có tiền sử dị ứng với các kháng sinh loại Aminoglycosid do có thể mẫn cảm chéo. Tiêm nội tủy mạc.	Bệnh nhân có chức năng thận bình thường: Người lớn: NK nặng 3mg/kg/ngày, chia làm 3 liều nhỏ cách nhau 8giờ/lần. Với nhiễm khuẩn đe dọa tính mạng, liều dùng có thể tăng lên đến 5mg/kg/ngày, chia đều các liều nhỏ cách nhau 6-8 giờ/lần. Liều dùng nên được giảm xuống 3mg/kg/ngày càng sớm càng tốt. Trẻ em: 6-7,5mg/kg/ngày, chia đều làm 3-4 lần/ngày Trẻ sơ sinh: Liều tối đa 4mg/kg/ngày chia làm 2 lần, 12giờ/lần đối với

			khác bị chống chỉ định, trong khi kết quả thử nghiệm tính nhạy cảm của vi khuẩn và đánh giá lâm sàng cho thấy việc sử dụng tobramycin là thích hợp.		trẻ có trọng lượng cơ thể 1,5-2,5kg. Thời gian điều trị 7-10 ngày. Bệnh nhân suy giảm chức năng thận: Sau khi tiêm liều 1mg/kg/lần, liều tiếp theo được điều chỉnh giảm liều cách nhau 8h
2	Metronidazol 500mg/100ml	Metronidazol là thuốc kháng khuẩn nhóm nitroimidazol	Dự phòng và điều trị các NK do vi khuẩn kỵ khí gây ra: NK ở hệ thần kinh trung ương, NK tai-mũi-họng, NT phổi và màng phổi, viêm màng trong tim, NT đường tiêu hóa và vùng bụng, NK phụ khoa, NT xương khớp, NK máu có viêm tĩnh mạch huyết khối.	Trong các trường hợp mẫn cảm với metronidazol hoặc các dẫn xuất nitroimidazol khác. Người bị bệnh tăng natri huyết, bị ứ dịch.	Dùng tiêm truyền tĩnh mạch, tốc độ truyền 5ml/phút +Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Trong ngày điều trị đầu tiên, cứ cách 6-8h một lần dùng 500mg metronidazol, cho đến tối đa 2g/ngày, trong ngày thứ hai và những ngày tiếp theo, cứ cách 12 giờ dùng 500mg. Thông thường, thời gian điều trị là

					5-7 ngày. Dự phòng NK trước mổ liều duy nhất 0,5-1g ngay trước khi bắt đầu mổ. +trẻ em <12tuổi: cách 8h một lần dùng 7-10mg/kg thể trọng
3	Tam thất vinaplant	Tam thất là chế phẩm YHCT thuộc nhóm Bổ huyết	Bồi bổ cơ thể, bổ máu, phục hồi sức khỏe phụ nữ sau sinh. Chữa chứng chảy máu do ứ huyết: Ho ra máu, chảy máu cam, kiết lỵ ra máu, rong kinh. Chữa sưng đau do chấn thương, thiếu máu, người mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt.	Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai	Ngày 2-3 lần sau bữa ăn. Trẻ em <6 tuổi, mỗi lần 1 gói 3g. Trẻ từ 6-14 tuổi, mỗi lần 1-2 gói 3g. Trẻ từ 14 tuổi và người lớn, mỗi lần 2-3 gói.

Trích từ hướng dẫn sử dụng thuốc của các thuốc: Vinbrex 80mg, Metronidazol 500mg, Tam thất vinnaplant.