

Số:  
V/v thông tin thuốc tháng 9

Ngọc Hồi, ngày tháng năm

Kính gửi: Các khoa, phòng trực thuộc.

Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế về việc Quy định tổ chức và hoạt động của khoa dược Bệnh viện;

Cập nhật thông tin thuốc đến Bác sỹ đang phục vụ khám, chữa bệnh và một số nhân viên y tế có liên quan đến sử dụng thuốc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi như sau:

Thông tin thuốc mới:

1. **ANELIPRA**(Enalapril 10mg).
2. **MEVOLREN**(Diclofenac 100mg + Menthol 400mg).
3. **LUFOGEL**(Dioctahedral smectit 3g)

Giao phòng Tổ chức - Hành chính đăng tải nội dung theo tờ Hướng dẫn sử dụng 03 thuốc (*có nội dung kèm theo*) tại chuyên mục Thông tin thuốc trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện để phục vụ nhân viên y tế tại khoa, phòng tự cập nhật kiến thức liên quan đến sử dụng thuốc nhằm thực hiện công tác sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi ./.

**Nơi nhận:**

- BGĐ (b/c);
- Các khoa, phòng trực thuộc (t/h);
- Lưu: VT; KD.

**GIÁM ĐỐC**

**Đặng Văn Đào**

STT	Tên thuốc	Hoạt chất - Nhóm dược lý	Chỉ định	Chống chỉ định	Liều dùng
1	<b>ANELIPRA</b> (Enalapril 10mg)	Enalapril là thuốc điều trị tăng huyết áp thuộc nhóm ức chế men chuyển angiotensin.	- Tăng huyết áp - Suy tim có triệu chứng - Phòng ngừa suy tim có triệu chứng ở bệnh nhân rối loạn chức năng tâm thất.	Quá mẫn với thành phần của thuốc Bệnh nhân có tiền sử phù mạch liên quan đến điều trị bằng thuốc ức chế men chuyển trước đó	Liều thông thường là 20mg mỗi ngày, tối đa 40mg mỗi ngày chia làm 2 lần
2	<b>MEVOLREN</b> (Diclofenac 100mg + Menthol 400mg)	<b>Diclofenac</b> là thuốc giảm đau, kháng viêm không steroid. <b>Menthol</b> là thuốc có tác dụng giảm đau tại chỗ.	Điều trị tại chỗ trong các trường hợp: giảm đau trong viêm khớp, giảm đau trong viêm do chấn thương ở gân, dây chằng, cơ và khớp.	Quá mẫn với thành phần của thuốc	Bôi thuốc ở vùng đau 3-4 lần mỗi ngày
3	<b>LUFOGEL</b> (Dioctahedral smectit 3g)	Dioctahedral smectit là thuốc điều trị tiêu chảy.	Điều trị triệu chứng tiêu chảy cấp và mạn tính ở trẻ em và người lớn. Điều trị triệu chứng đau do viêm thực quản – dạ dày – tá tràng và đại tràng	Quá mẫn với thành phần của thuốc	Trẻ em: Uống 1-2 gói/ ngày chia làm 2 lần Người lớn: Uống 3 gói/ ngày chia làm 2-3 lần

*Trích từ hướng dẫn sử dụng thuốc của các thuốc: ANELIPRA, MEVOLREN, LUFOGEL*